

QRcodes Théranovalim Prescripteurs

SERVICE D'HÉMATOLOGIE ET DE THÉRAPIE CELLULAIRE
 Tél. 05 55 05 66 42 (8h30 à 17h)
 Tél. 05 55 05 66 72 (Week-end et Nuit)

ORDONNANCE

HÔPITAL DUPUYTREN
 2, avenue Martin Luther-King
 87042 LIMOGES CEDEX
 www.chu-limoges.fr
 Tél. 05 55 05 66 55

N° PNE 99
 8700004
 Pr. Pascal ACCARD
 Chef de Service
 N° SIRET : 1000292414


Nom : A Prénom : P
 Age : 75 ans Sexe : M Taille : 173.00 cm Poids : 82.00 kg

Prescription relative au traitement de l'affection de longue durée reconnue
 (État ou hors liste)
(AFFECTIION EXONÉRANTE)

> **Traitement Orotinib 50 mg cp**
 3 comprimés x 12h, à 8h, Voie orale, pendant 3 Mois

Prescription SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

Identification du Prescripteur Date **00/00/00** Page 1/1
DOC_SIGNAIRE Signature du Praticien
 (CPPS EFFICACITE/RI/00)



<https://qrcode.theranovalim.fr>

SERVICE D'HÉMATOLOGIE ET DE THÉRAPIE CELLULAIRE
 Tél. 05 55 05 66 42 (8h30 à 17h)
 Tél. 05 55 05 66 72 (Week-end et Nuit)

ORDONNANCE - TEST

HÔPITAL DUPUYTREN
 2, avenue Martin Luther-King
 87042 LIMOGES CEDEX
 www.chu-limoges.fr
 Tél. 05 55 05 66 55

N° PNE 99
 8700004
 Pr. Pascal ACCARD
 Chef de Service
 N° SIRET : 1000292414

Nom : A Prénom : P
 Age : 75 ans Sexe : M Taille : 173 cm Poids : 82 kg

Prescription relative au traitement de l'affection de longue durée reconnue
 (État ou hors liste)
(AFFECTIION EXONÉRANTE)

> **TRAITEMENTINIB (Orotinib) 50 mg cp**
 3 comprimés x 12h, à 8h, Voie orale, pendant 3 Mois

Prescription SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

Identification du Prescripteur Date 19/10/2022 Page 1/1
TOUATI MOHAMED Signature du Praticien
 (CPPS 1000292414)

CHU LIMOGES
 Dr M. TOUATI
 1000292414

QRcodes Théranovalim

Utilisateurs : Patients - Professionnels

SERVICE D'HÉMATOLOGIE ET DE THÉRAPIE CELLULAIRE
 Tél. 05 55 05 66 42 (8h30 à 17h)
 Tél. 05 55 05 66 72 (Week-end et Nuit)

ORDONNANCE - TEST

Nom : A Prénoms : P
 Age : 75 ans Sexe : M Taille : 173 cm Poids : 82 kg

HÔPITAL DUPUYTREN
 2, avenue Martin Luther King
 87042 LIMOGES CEDEX
 www.chu-limoges.fr
 Tél. 05 55 05 66 55

Pr Anouk ACCARD
 Chef de Service
 N° 1002392414

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue
 (Bite ou bien liste)
 (AFFECTIION EXONERANTE)

> TRAITEMENTINIB (Orotinib) 50 mg rp
 3 comprimés x 120h, à 1h. Voie orale, pendant 3 Mois

Prescription SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
 (MALADIES INTERCURRENTES)

Identification du Prescripteur : TOUATI MOHAMED
 Date : 19/10/2022
 Signature du Praticien :
 CHU LIMOGES
 Dr M. TOUATI
 1002392414

Page 1/1



Collège Hospitalier Oncologie Hématologie (CHOH)
 Document actualisé le 20/10/2022 et validé par le CHOH

Fiche conseil Patient

Traitementinib
Orotinib®

Forme/Présentation/Pré
 - **Forme** :

- **Présentation** : Boîte de 30 comprimés sous plaquettes thérapeutiques.

- **Pris orales** pour tous les dosages : 2 023 à la boîte de 30 comprimés, soit 67,44 € le comprimé.

Votre posologie est unique et individuelle, pour l'échelle, votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos anticécobants et de votre tolérance au traitement.

La thérapie ciblée orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite un suivi rigoureux.

Consignes générales

Respectez votre prescription médicale et prenez systématiquement chaque comprimé sur un carnet.

Vous ne devez jamais croquer, écorcher, mâcher ni sucer les comprimés de Orotinib. Vous ne devez jamais ouvrir, mâcher, ni sucer les plaquettes de Orotinib. Ne pas ingérer l'urine ou le site est fissuré ou endommagé.

En cas d'oubli de la prise de comprimés : prenez la prochaine dose normalement et ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

Si vous avez oublié une prise de Orotinib® : Si moins de 12 heures avant la prochaine prise : prenez la dose normale. Si plus de 12 heures avant la prochaine prise : ne prenez pas la dose oubliée.

En cas de vomissements : attendez la prise suivante et ne doublez pas les quantités.

Si vous avez pris accidentellement trop de comprimés, contactez immédiatement votre oncologue. N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre oncologue.

Collège Hospitalier Oncologie Hématologie (CHOH)
 Document actualisé le 20/10/2022 et validé par le CHOH

Fiche conseil Professionnel de santé

Traitementinib
Orotinib®

Classe pharmacologique
 Inhibiteur de protéine kinase

Indication
 En monothérapie dans le traitement du lymphome B folliculaire en 2^{ème} relapse.

Dosage
 3 comprimés 50 mg par jour.

En cas d'oubli
 - Si moins de 12 heures avant la prochaine prise : prendre la dose normale. - Si moins de 12 heures avant la prochaine prise : ne pas prendre la dose oubliée.

Mode d'administration
 Prendre Orotinib® avec un grand verre d'eau, sans nourriture, tous les jours à la même heure et de la même façon. Aucun aliment ne doit être consommé dans les 3 heures précédant la prise du comprimé et dans l'heure suivant cette prise. Prendre le Orotinib® avec un grand verre d'eau, de préférence à la même heure de la journée, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer, écorcher, ni mâcher les comprimés.

Précautions d'usage
 Ce médicament contient du lactose : ne pas l'administrer chez les patients ayant une intolérance au galactose, un déficit en lactase, une malabsorption du glucose/galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions médicamenteuses
 Orotinib® est métabolisé par le cytochrome CYP3A4; prendre en compte l'association à des inducteurs et des inhibiteurs de l'enzyme CYP3A4.