

Fiche professionnel de santé



Classe pharmacologique

Inhibiteur de protéine kinase.

Indication

En monothérapie dans le traitement du lymphome B folliculaire en 2^{ème} rechute.

Posologie

1 cp deux fois par jour.

En cas d'oubli :

- il reste **plus de 12 heures** avant la prochaine prise : **prendre la dose normale**,
- il reste **moins de 12 heures** avant la prochaine prise : **ne pas prendre la dose oubliée**.

Mode d'administration

Prendre Orotinib® avec un grand verre d'eau **sans nourriture** tous les jours à la même heure et de la même façon.

Aucun aliment ne doit être consommé dans les 3 heures précédant la prise du comprimé et dans l'heure suivant cette prise.

Prendre le Orotinib® deux fois par jour avec un grand verre d'eau, de préférence à la même heure de la journée, **pendant ou en dehors des repas**.

Ne pas écraser, croquer, ni mâcher les comprimés.

Précautions d'emploi

Ce médicament **contient du lactose**, ne pas l'administrer chez les patients ayant une intolérance au galactose, un déficit en lactase, une malabsorption du glucose/galactose (maladies héréditaires rares).

Interactions médicamenteuses

Orotinib® est **métabolisé par le cytochrome CYP3A4**: prendre en compte l'association à des inducteurs et des inhibiteurs de l'enzyme CYP3A4 :